



**ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
взрослому или ребёнку,
которые находились в тесном контакте
с больным туберкулёзом
или у кого при профилактическом
обследовании была обнаружена
положительная кожная проба с АТР,
НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ
ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ КУРС
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
ТУБЕРКУЛЕЗА.**

Это единственный правильный выбор человека, желающего не болеть туберкулёзом.

**Химиопрофилактика туберкулёза
позволяет предотвратить
развитие туберкулёзного
процесса в организме человека.**

Фтизиатры Москвы – на страже здоровья Ваших лёгких. Выполняйте рекомендации фтизиатров и **Будьте здоровы!**



Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулёзом Департамента здравоохранения г. Москвы:
107014, ул. Стромывка, 10.
Справочная служба: +7 (499) 268-01-31
Сайт: <http://www.mnpcbt.ru>

Адреса филиалов:

- Клиника № 1: ул. Стромывка, 10. Тел. +7 (499) 268-01-31
- Клиника № 2: ул. Барболина, 3. Тел. +7 (499) 268-26-61
- Клинико-диагностический центр по внелёгочному туберкулёзу: ул. Барболина, 3. Тел. +7 (499) 268-68-01
- Детское консультационно-диагностическое отделение: ул. Барболина, 3. Тел. +7 (499) 268-26-21
- Клинико-диагностический центр для взрослых: ул. Радио, 18. Тел. +7 (499) 267-57-92
- Филиал по ВАО и СВАО:
 - 1) Сиреневый б-р, 6. Тел. +7 (499) 164-37-35
 - 2) ул. Metallургов, 37. Тел. +7 (495) 304-98-54
 - 3) ул. Докукина, 18. Тел. +7 (499) 187-96-90
 - 4) ул. Гончарова, 4. Тел. +7 (495) 618-01-58
- Филиал по ЗелАО: Зеленоград, 1-й Западный пр-д, 8. Тел. +7 (499) 734-52-27
- Филиал по САО: ул. Михалковская, 65. Тел. +7 (495) 450-49-00
- Филиал по СЗАО: ул. Щукинская, 38. Тел. +7 (499) 190-04-11
- Филиал по ЦАО и ЗАО:
 - 1) ул. Радио, 18. Тел. +7 (499) 261-09-45
 - 2) ул. Тарутинская, 2. Тел. +7 (499) 142-87-34
- Филиал по ЮВАО: ул. 8-я Текстильщиков, 2. Тел. +7 (499) 179-60-10
- Филиал по ЮЗАО (и ТинАО):
 - 1) Севастопольский пр., 26. Тел. +7 (499) 120-92-83
 - 2) ул. Новаторов, 17. Тел. +7 (495) 935-14-62
- Филиал по ЮАО: ул. Речников, 25. Тел. +7 (499) 614-52-31

Почему необходимо вовремя проводить химиопрофилактику туберкулёза?



Туберкулёз – инфекционное заболевание, которым даже в XXI веке может заболеть взрослый и ребенок. Его вызывают микобактерии туберкулёза.

Если Вы общались

с заболевшим туберкулёзом –

- жили в квартире и подъезде,
- вместе учились или работали,
- находились в одной компании, –

первое, что необходимо сделать – пройти обследование для исключения туберкулёза.

Это обследование не займёт много времени.

Оно включает:

- флюорографию и
- тест с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным.

Флюорографическое обследование высокоэффективно при раннем выявлении любой болезни лёгких, в том числе туберкулёза.

Тест с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (АТР) – это не прививка. Это иммунологическая проба.

АТР вызывает кожную реакцию в месте введения препарата только при наличии в организме человека активно размножающихся микобактерий туберкулёза.

Тест с АТР получен методом генной инженерии. В его составе – белок, содержащий два антигена, которые есть в микобактериях туберкулёза и отсутствуют в противотуберкулёзной вакцине БЦЖ, которую делают всем новорожденным в России.

Тест с АТР имеет высокую степень очистки и абсолютно безопасен для человека. Он используется во всех возрастных группах и может применяться даже у беременных женщин.

Всем,

- кто был в тесном контакте с больным активным туберкулёзом,
- у кого проба с АТР положительная,

проводится химиопрофилактика туберкулёза, то есть назначается профилактическое лечение латентной инфекции по специальным схемам.

Химиопрофилактику туберкулёза необходимо провести ВОВРЕМЯ, то есть СРАЗУ после выявления положительной пробы с АТР.

Профилактическое лечение туберкулёза проводится, если при флюорографическом обследовании ваших лёгких патологии не выявлено, а иммунологическая проба положительная. Если тест с АТР положительный, то врач назначит вам компьютерную томографию (КТ). Если КТ не выявит патологии, вам назначат химиопрофилактику туберкулёза. Ведь положительный тест с АТР говорит о том, что микобактерии туберкулёза в организме начали активное размножение, поэтому высока вероятность в течение 1–2 лет заболеть туберкулёзом. Такое состояние называется латентной инфекцией (предболезнью).

Белая ромашка – символ борьбы с туберкулёзом



Латентная туберкулёзная инфекция

не является болезнью. Её характеристики:

- нет клинических признаков,
- не выявлен возбудитель,
- не регистрируется лучевыми методами,
- не ограничивает трудоспособность,
- не влияет на профессиональную пригодность,
- имеются положительные иммунологические маркеры туберкулёзного процесса,
- является значимым фактором риска развития локальной формы туберкулёза,
- в большинстве случаев требует превентивных мероприятий (химиопрофилактики туберкулёза).

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ЕСЛИ НЕ ПРОВЕСТИ ХИМИОПРОФИЛАКТИКУ ТУБЕРКУЛЁЗА?

Туберкулёз в XXI веке излечим. Но лечится он долго: от 6 месяцев до 1–2 лет. И на время лечения пациент выпадает из полноценной активной жизни и круга привычного общения, нередко оставаясь только в Интернет-сообществах и социальных сетях.

Заболевший туберкулёзом на время болезни (то есть на длительный срок) остаётся без работы. А люди, чья работа связана с детьми, могут потерять её навсегда. Студенты и школьники вынуждены в случае туберкулёза прерывать учёбу. Получение высшего или среднего образования затягивается как минимум на год. К сожалению, такова реальность. Но её можно изменить.